

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

FC CALCIO BORO es una solución altamente concentrada y soluble de Calcio y Boro para uso foliar. Contiene ácidos carboxílicos de alto performance que permiten que se asimile el 100% del producto y no se volatilice ni se lixivie y sin que se originen reacciones contrarias ni toxicidades. Su aplicación se encuentra vinculada a potenciar el metabolismo, fortalecer y permeabilizar la célula, y apoyar la activación enzimática. Su uso es recomendado para la prevención y corrección de deficiencias de Calcio y Boro, además forma compuestos que son esenciales durante el periodo de polinización y cuajado de frutos.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Fertilizante foliar a base de Calcio - Boro
- **Clase de uso** : Nutriente Foliar
- **Tipo de formulación** : Suspensión Concentrada (SC)

VENTAJAS DE USO:

- El calcio confiere estabilidad al aparato estructural durante la división celular, constituyendo pectatos de calcio en las láminas media de las células vegetales.
- El boro interviene en la diferenciación y desarrollo celular, la elongación de células, la fuerza y elasticidad de la pared celular.
- El calcio también cumple la función de activar, consolidar el crecimiento y elongar del tubo polínico.
- El boro cumple la función de viabilizar el grano de polen para la formación adecuada del tubo polínico
- Estimula el desarrollo de ramas, hojas, raíces y frutos bien conformados.
- Forma compuestos que son esenciales durante el periodo de polinización y cuajado de frutos.

COMPOSICIÓN:

Formulación	%p/v
Calcio (CaO)	14
Boro (B) Fuente de ácido bórico	1
Nitrógeno (N)	4
Ácidos carboxílicos	0.2

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVOS	DOSIS		MOMENTO DE APLICACIÓN
	L/200L	ml/20L	
Mango, Palto y Olivo	0.5 - 1	100	Al inicio de floración. Al inicio de desarrollo del fruto. 15 días antes de la cosecha.
Cítricos	0.5 - 1	100	Al inicio de la floración. A los 15 días después de la primera aplicación. Al inicio de la maduración del fruto.
Hortalizas en general	0.5 - 1	100	A partir de 6 hojas verdaderas repetir cada 15 días, hasta 15 días antes de la cosecha.
Alcachofa	0.5 - 1	100	A los 15 días después del trasplante. Al inicio de formación del capítulo.
Cebollas y ajos	0.5 - 1	100	A los 8 días después del trasplante. Al inicio de la bulbificación. Al inicio de maduración.
Vid	0.5 - 1	100	Al inicio de la floración. Al inicio del crecimiento de la baya. A los 15 días antes de la cosecha.
Papa	0.5 - 1	100	Al inicio de la floración. Antes del aporque.
Frijol y vainita	0.5 - 1	100	Al inicio de floración. Al inicio del desarrollo del fruto.
Zapallo, sandía	0.5 - 1	100	Cuando la planta tiene 6 hojas. A los 12 días después de la primera aplicación.
Manzano y melocotón	0.5 - 1	100	Al inicio de la floración A los 15 días después de la primera aplicación Al inicio de la maduración del fruto
Espárragos	0.5 - 1	100	Al inicio del primer brote. Al inicio del segundo brote. A los 25 días antes del chapodo.
Arroz	0.5 - 1	100	En el punto de algodón. En el desarrollo de los granos.

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡FC CALCIO BORO ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

