

# FC CALBOZIN

## I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

### 1. CARACTERÍSTICAS

**FC CALCIO BORO ZINC** es un fertilizante líquido complejado con ácidos Carboxílicos que previene y corrige las deficiencias de estos elementos en todos los cultivos como hortalizas y frutales. Esencial en la polinización y cuajado a fin de evitar la caída de flores y fruto, les da rigidez a las paredes de las células mejorando las condiciones post cosecha, promueve la división de las células, floración y producción de semillas e interviene en la síntesis de las auxinas.

**FC CALCIO BORO ZINC** puede aplicarse tanto vía foliar como por vía radicular, mediante los diferentes sistemas de aplicación.

### 2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Foliar a Base de Calcio - Boro - Zinc
- **Clase de uso** : Nutriente Foliar
- **Tipo de formulación** : Suspensión concentrada (SC)
- **Distribuido por** : Farm Crop S.A.C.

#### VENTAJAS DE USO:

- **Calcio**, este elemento fortalece las paredes celulares de la planta, confiriéndole cierta rigidez para el ingreso de algunas enfermedades, además de prevenir y corregir algunos desordenes fisiológicos como la pudrición apical del fruto del tomate y pimiento.
- **Boro**, este elemento es clave para una mejor polinización, fecundación y cuajado de los frutos, mejora también la movilización, el transporte de azúcares de las hojas a los frutos, zonas de reserva.
- **Zinc**, este elemento está ligado a la activación de las Auxinas, hormona de crecimiento muy importante en las plantas, ayudando al alargamiento de los entrenudos, debemos tener en cuenta la importancia de este elemento que su deficiencia puede reducir en un 20% el rendimiento.

#### COMPOSICIÓN:

<b>Calcio (CaO)</b>	<b>12</b>
<b>Boro (B<sub>2</sub> O<sub>3</sub>)</b>	<b>2.5</b>
<b>Zinc (ZnO)</b>	<b>3.0</b>
<b>Aminoácidos</b>	<b>5</b>
<b>Magnesio (Mg)</b>	<b>800 ppm</b>

# FC CALBOZIN

Hierro (Fe)	325 ppm
Manganeso (Mn)	325 ppm
Cobre (Cu)	32.5 ppm
Molibdeno (Mo)	18.0 ppm

## II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	L/Ha	L/200 L	Momentos de Aplicación
Alcachofa	2 - 3	1	Al inicio del brotamiento de la inflorescencia
Arroz	2 - 3	1	Al inicio del espigado. En pleno desarrollo del grano.
Vid	2 - 3	1	2 aplicaciones antes de la floración 2 aplicaciones después de la floración.
Zapallo, sandía y melón	2 - 3	1	En prefloración Al inicio de cuajado.
Espárrago	2 - 3	1	Al inicio del brotamiento. Al inicio del segundo brotamiento A los 20 días antes del chapodo
Ajo	2 - 3	1	Al inicio de la bulbificación Repetir 2 aplicaciones
Cítricos y paltos	2 - 3	1	A los 30 días antes de la floración. Después del cuajado. Al inicio del crecimiento del fruto. A los 20 días antes de la cosecha.
Fresa	2 - 3	1	A los 30 días después de la siembra. Antes de la floración. En pleno desarrollo del fruto.
Manzano y melocotón	2 - 3	1	A los 30 días antes de la floración. Después del cuajado. Al inicio del crecimiento del fruto. A los 20 días antes de la cosecha.
Papa	2 - 3	1	A los 20 días después del brotamiento Luego del aporque.
Tomate	2 - 3	1	A los 20 días después de la siembra. Al inicio de la formación del botó floral. En pleno desarrollo del fruto.
Frejol, arveja y holantao	2 - 3	1	Antes de la floración. Después del cuajado.

# FC CALBOZIN

## III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

## IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

## V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

### TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440

## VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



## VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

**¡FC CALBOZIN ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!**

**IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC**  
**DIRECCIÓN:** Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.  
**TELÉFONO:** 975233440 - 949120727



os Recaudadores Ate - Lima  
 75233440-949120727  
 mcrop1.com