

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

FC FÓSFORO 40 es un fertilizante foliar (macronutriente) con elevada concentración de fósforo asimilable (40%), nitrógeno, potasio y extracto húmico, dándole a la planta una concentración balanceada de nutrientes fundamental en la división celular, aporte de energía durante la fotosíntesis, promueve el transporte de carbohidratos, estimula el crecimiento de raíces, la formación de semillas, proporciona vigor a los cultivos para defenderse de las inclemencias del invierno. Contiene en su formulación ácidos húmicos que actúa como agente complejante ayudando a una mejor penetración y translocación de los nutrientes y micronutrientes dentro de la planta. Su carencia se manifiesta con un retraso en la floración y baja producción de frutos y semilla.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre común** : Fitonutriente especial a base de Fósforo
- **Clase de uso** : Nutriente foliar
- **Tipo de formulación** : Concentrado soluble (SC)

VENTAJAS DE USO:

- Facilita la formación rápida del crecimiento de las raíces.
- Aporta energía durante la fotosíntesis y el transporte de carbohidratos.
- Fundamental en la división celular.
- Proporciona vigor a los cultivos para defenderse de las inclemencias del invierno.
- Estimula la formación de semillas.

COMPOSICIÓN:

FORMULACIÓN	% p/v
Fósforo (P2O5)	40
Nitrógeno (N)	2
Potasio (K2O)	3
Magnesio	2
Ácidos húmicos	5

II. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS L/200 L	RECOMENDACIONES
Vid	1	Antes de la floración. Al inicio del crecimiento del racimo. A los 15 días antes de la cosecha.

CULTIVO	DOSIS L/200 L	RECOMENDACIONES
Alcachofa	1	A los 15 días después del trasplante. Al inicio de formación del capítulo.
Frijol y vainita	1	A l inicio del cuajado. En pleno crecimiento y llenado de las vainas.
Paltos	1	Antes de la floración. A la caída de pétalos. Crecimiento del fruto.
Ajos y cebollas	1	A los 8 días después del trasplante. Al inicio de bulbificación. Durante el llenado del bulbo
Espárragos	1	Al inicio del primer brote. Al inicio del segundo brote. A los 25 días antes del chapodo.
Zapallo, sandía y melón	1	Al inicio de la floración femenina. Pleno crecimiento de frutos. Cada 15 días después de la última aplicación
Cítricos	1	Antes de la floración. A la caída de pétalos. Crecimiento del fruto.
Manzano	1	Antes de la floración. A la caída de pétalos. Crecimiento del fruto.
Fresa	1	Al inicio de la floración. Al inicio del desarrollo del fruto. Cada 15 días después de la segunda aplicación
Pepino dulce	1	Al inicio de floración. Al inicio del desarrollo del fruto. Cada 15 días después de la segunda aplicación

Envases de 1L, 4 L y 20 L

III. COMPATIBILIDAD:

Es incompatible con productos de marcada reacción alcalina o ácida, hacer pequeñas pruebas en caso de dudas.

IV. FITOTOXICIDAD:

No se ha observado fitotoxicidad para los cultivos si se siguen las recomendaciones dadas en el cuadro de usos.

V. PRIMEROS AUXILIOS

- En caso de contacto con la piel, se recomienda quitarse la ropa y lavarse con abundante agua y jabón.

- En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua al menos 15 minutos. Si la irritación persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de inhalación: Si la exposición al producto produjese algún tipo de irritación o malestar, colocar a la persona al aire libre y retirarle la ropa de aplicación. Si el malestar persiste, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.
- En caso de ingestión, acudir inmediatamente al médico portando la etiqueta del producto.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- **SAMU: 106**
- **FARM CROP S.A.C. : 949120727-975233440**

VI. MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado



VII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase, corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

¡FC FOSFORO ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Calle los Acantos Nro. 167. Int 104. Urb. Los Recaudadores Ate - Lima.

TELÉFONO: 975233440 - 949120727

