

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

COMARKA 500 SC está compuesto por el ingrediente activo Thiabendazole, es un fungicida sistémico que actúa inhibiendo la división celular afectando el crecimiento del hongo.

COMARKA 500 SC es rápidamente absorbido por la planta y llega directamente a los sitios de infección, impidiendo que las enfermedades dañen al cultivo.

COMARKA 500 SC pertenece al grupo químico de los benzimidazoles que actúan en la inhibición de la mitosis y división celular de los hongos susceptibles inhibiendo la formación del huso acromático, el cual está compuesto de micro túbulos. Los benzimidazoles son inhibidores específicos de ensamble de los microtubulos. Los microtubulos son unas moléculas importantes en la formación y segregación de cromosomas en la división celular. Si este proceso se ve interrumpido causa la muerte de la célula fungosa.

2. Identidad del ingrediente activo y composición del producto formulado.

- **Nombre comercial** : **COMARKA 500 SC**
- **Ingrediente Activo** : Thiabendazole 500 g/L
- **Clase de uso** : Fungicida Agrícola
- **Tipo de formulación** : Suspensión Concentrada.
- **Grupo Químico** : Benzimidazole
- **Registro Senasa** : PQUA Nº 3320 - SENASA
- **Titular del registro** : FARM CROP S.A.C.
- **Importado y distribuido por:** FARM CROP S.A.C.
- **Formulador** : NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.

II. PROPIEDADES FÍSICAS QUÍMICAS

- **Estado Físico:** Liquido
- **Color:** Blanquecino
- **Olor:** Aromático débil
- **Densidad relativa:** 1.16 g/ml (20 °C)
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **PH:** 6.65
- **Explosividad:** No Explosivo
- **Corrosividad:** No corrosivo

Jr. Pinos del Valle Nro. 131 Dpto. 202 Urb. Residencial Higuiereta - Santiago de Surco - Lima
Sitio Web: www.farmcrop1.com 975233440
Correo electrónico: ventas@farmcrop1.com

- Estabilidad de almacenamiento: 2 años
- Estabilidad de emulsión: No aplica

III. RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	PLAGA		DOSIS	P.C. (DÍAS)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico	L/ 200L		
PALTO	Muerte regresiva	<i>Lasiodiplodia theobromae</i>	0.20	15	15

P.C.: Período de carencia (días)

L.M.R.: Límite máximo de residuos (ppm-partes por millón)

IV: PERÍODO DE REINGRESO

No permitir el reingreso a las áreas tratadas antes de las 24 horas de realizada la aplicación.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

- SAMU: 106
- FARM CROP S.A.C.: 975233440

V. COMPATIBILIDAD

COMARKA 500 SC puede aplicarse en mezcla con la mayoría de plaguicidas. Excepto con productos agentes oxidantes, agentes cáusticos fuertes y soluciones alcalinas.

VI. FITOTOXICIDAD

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.

VII. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.



VIII. RESPONSABILIDAD CIVIL

El Titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información comuníquese con el titular del registro o con el distribuidor del producto.

¡COMARKA 500 SC ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC
DIRECCIÓN: Jr. Pinos del Valle Nro. 131 Dpto. 202 Urb. Residencial
Higuereta - Santiago de Surco - Lima
TELÉFONO: 975233440

