

MATEX[®] 400 SC

I. INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

1. CARACTERÍSTICAS

MATEX 400 SC[®] es un fungicida de contacto con acción translaminar, con alta eficacia preventiva y curativa contra enfermedades causadas por hongos.

MATEX 400 SC[®] interviene en la síntesis de aminoácidos y proteínas, necesarias en la etapa inicial del proceso de infección, evitando y deteniendo el proceso infectivo del patógeno. Además, impiden la asimilación de nutrientes, el desarrollo del tubo germinativo y por lo tanto el crecimiento del hongo.

MATEX 400 SC[®] se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar en aspersión foliar con equipos de aplicación terrestre. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

2. Características Generales.

- **Nombre común** : MATEX
- **Ingrediente Activo** : Pyrimethanil
- **Clase de uso** : Fungicida Agrícola
- **Concentración** : 400 g/L
- **Tipo de formulación** : Suspensión Concentrada
- **Registro Senasa** : PQUA N° 3409
- **Titular del registro** : FARM CROP S.A.C.
- **Formulador** : NANJING ESSENCE FINE-CHEMICAL CO., LTD.
- **Importado y distribuido por** : FARM CROP S.A.C.

3. Ventajas de Uso.

MATEX 400 SC[®] interviene en la síntesis de aminoácidos y proteínas, necesarias en la etapa inicial del proceso de infección, evitando y deteniendo el proceso infectivo del patógeno. Además, impiden la asimilación de nutrientes, el desarrollo del tubo germinativo y por lo tanto el crecimiento del hongo.

4. Propiedades físico Químicas.

- **Aspecto:** Líquido
- **Color:** Blanquecino
- **Olor:** Inodoro¹³
- **Densidad:** 1080 g/L a 20°C¹⁴

MATEX[®] 400 SC

- **Propiedades Explosivas:** No explosivo
- **Estabilidad:** No aplica
- **Inflamabilidad:** No inflamable
- **Suspensibilidad:** 90% min

II. Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA		Dosis L/ 200L	P.C. (días)	L.M.R. (ppm)
	Nombre Común	Nombre Científico			
Mandarina	Moho gris	<i>Botrytis cinerea</i>	0.2	1	8

III. Instrucciones de Uso:

MATEX 400 SC[®] se prepara diluyendo la dosis indicada en un recipiente con agua y luego vaciar la solución en el recipiente final completando con agua hasta el volumen requerido, agitando hasta obtener una mezcla homogénea. Usar agua limpia. Aplicar en aspersión foliar con equipos de aplicación terrestre. Las plantas deben mojarse por completo sin llegar al escurrimiento, previa calibración de los equipos de aplicación.

IV. Frecuencia y época de aplicación:

Realizar como máximo 1 aplicación por campaña al año, previa evaluación de la plaga y cuando las condiciones climáticas sean favorables para su desarrollo. Dosis máxima: 1.4 L/ha. En caso de persistir la plaga, usar otro producto con mecanismo de acción diferente.

V. Periodo de Reingreso:

Se puede reingresar al campo 12 horas después de aplicado el producto. En caso se requiera ingresar antes, se deberá usar equipo de protección.

VI. Compatibilidad:

MATEX 400 SC[®] es compatible con la mayoría de plaguicidas de uso común excepto con agentes oxidantes, ácidos fuertes y bases fuertes. Se recomienda realizar una prueba previa de compatibilidad.

VII. Fitotoxicidad:

La aplicación de dosis superiores a las señaladas en el cuadro de usos, podrían ocasionar fitotoxicidad en el cultivo. Aplicar sólo las dosis señaladas en el cuadro de usos.



MATEX[®] 400 SC

VIII. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES VACÍOS

- Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo perforándolo y deposítelos en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

XI. Teléfonos de emergencia:

SAMU: 106

FARM CROP S.A.C.: 975233440



¡MATEX 400 SC[®] ES UN PRODUCTO CON CALIDAD GARANTIZADA!

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC
DIRECCIÓN: Jr. Pinos del Valle Nro. 131 Dpto. 202 Urb. Residencial Higuiereta. - Santiago de Surco - Lima
TELÉFONO: 975233440- 949120727

