

PILARMECTIN 1.8 EC

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

TIPO DE PRODUCTO	: INSECTICIDA AGRÍCOLA
INGREDIENTE ACTIVO	: Abamectina 1.8 EC
FORMULADOR	: Emulsión Concentrada- EC
GRUPO QUÍMICO	: Avermectina
TITULAR DE REGISTRO	: PILARBIO PERU S.A.C
IMPORTADOR Y DISTRIBUIDOR	: FARM CROP S.A.C
NÚMERO DE REGISTRO	: PQUA N° 1585 SENASA

2. INFORMACIÓN TÉCNICA

GENERALIDADES :

PILARMECTIN 1.8 EC es un producto natural cuyo ingrediente activo es la abamectina, el cual es obtenida del microorganismo del suelo *Streptomyces avermitilis*. Tiene acción translaminar y afecta a muchas especies de ácaros e insectos; los cuales al entrar en contacto con el producto quedan irreversiblemente paralizados y de esta manera mueren.

MODO DE ACCIÓN: PILARMECTIN 1.8 EC por ingestión y por contacto.

MECANISMO DE ACCIÓN : PILARMECTIN 1.8 EC bloquea la actividad eléctrica de los nervios y los músculos, impidiendo la transmisión de impulsos motores en el ácaro, originando parálisis y produciéndole la muerte.

3. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO

MODO DE EMPLEO:

PILARMECTIN 1.8 EC se aplica en mezcla con agua. Para la aplicación, se debe llenar el tanque de aplicación hasta la mitad o $\frac{3}{4}$ partes de su capacidad, hacer una premezcla en una reducida cantidad de agua en un balde o recipiente, agitar bien hasta formar una mezcla homogénea, vierta la mezcla al tanque de aplicación y complete el volumen de agua a utilizar. Es recomendable que el equipo cuente con un buen sistema de agitación.

4. RECOMENDACIÓN DE USO

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS L/ha	PC	LMR (ppm)
Mandarina	Acaro del tostado (<i>Phyllocoptruta oleivora</i>)	1.5	3	0.01

L.M. R= Límite máximo de residuo, PC = Período de carencia

PILARMECTIN 1.8 EC

5. FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Aplicar al inicio de la detección de la plaga y repetir cuando sea necesario. Al aplicar el producto tener en cuenta que debe hacerse un cubrimiento total de la planta, sin llegar al escurrimiento. Se recomienda un máximo 2 aplicaciones por campaña o año.

6. PERÍODO DE REINGRESO: No reingresar al área tratada 24 horas después de la aplicación.

7. COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos fitosanitarios de uso común a excepción de aquellos de reacción alcalina. Se recomienda realizar pruebas de compatibilidad previa.

8. FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico al cultivo recomendado, al ser aplicado de acuerdo a las instrucciones de esta etiqueta y a las Buenas Prácticas Agrícola

9. CONDICIONES DE MANEJO Y DE DISPOSICION DE DESECHOS Y ENVASES VACIOS:

- Ningún envase que haya contenido plaguicida debe reutilizarse.
- Después de usar el contenido, enjuague 3 veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación; y luego inutilícelo, triturándolo y/o perforándolo, y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin.
- Devuelva el envase triple lavado al centro de acopio autorizado.
- Realizar obligatoriamente el triple lavado del presente envase.

10. RESPONSABILIDAD CIVIL:

El titular del registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las indicaciones e instrucciones dadas. Si requiere mayor información. Si requiere mayor información comuníquese con el titular de registro o con el distribuidor del producto.

TELEFONOS DE EMERGENCIA: SAMU: 106 ESSALUD: 117 / PILARBIO PERU
SAC: 3638659 / FARM CROP S.A.C. 949120727

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO "MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS"

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR: FARM CROP SAC

DIRECCIÓN: Urb. Prolongación Benavides Mz. B4 Lote 4 Dpto. 202 - Santiago de Surco - Lima

TELÉFONO: 949120727- 959205427

